

PATIËNTENFOLDER

*Algemene Chirurgie |
Proctoscopie met rubberbandligatie*

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

In overleg met uw arts heeft u besloten om een proctoscopie te laten doen. Dit is een onderzoek van de anus en het laatste gedeelte van de endeldarm. Hoe moet u zich thuis voorbereiden? Kunnen aambeien meteen verwijderd worden? Dat en meer leest u in deze folder. De informatie is bedoeld als aanvulling op het gesprek dat u met de chirurg heeft gehad. Realiseert u zich dat voor u de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven.

Wat is een proctoscopie?

Bij dit onderzoek kijkt de arts of er afwijkingen of bijzonderheden zijn aan de anus of aan het onderste gedeelte van de endeldarm. Afwijkingen kunnen bijvoorbeeld zijn: aambeien, een scheurtje van de huid (fissuur), een ontsteking of een vernauwing. Aambeien kunnen tijdens de proctoscopie vaak direct worden behandeld. Voor de andere aandoeningen kan de arts een behandelplan maken op basis van het onderzoek. De arts onderzoekt u met een proctoscoop. Dit is een plastic of metalen buisje met daarin een lampje. Voor u kan de situatie anders zijn dan hier is beschreven.

Behandeling van aambeien

Aambeien kunnen tijdens de proctoscopie vaak direct worden behandeld.

- De arts plaatst via de proctoscoop enkele elastiekjes boven of om de aambeien. Dit heet rubberbandligatie;
- Het plaatsen van de elastiekjes kan een onaangenaam gevoel in de onderbuik geven. Deze klachten worden meestal binnen 48 uur minder. Zo nodig kunt u Paracetamol gebruiken;
- U kunt aandrang krijgen, ook als er geen ontlasting komt. Deze klachten worden meestal binnen 48 uur minder;
- Binnen vijf tot zeven dagen na de behandeling verdwijnen de elastiekjes samen met de ontlasting. Er kan tijdelijk wat (meer) bloedverlies optreden. U hoeft zich daar niet ongerust over te maken.

Het onderzoek

- U ligt op uw linkerzij;
- De arts brengt de proctoscoop in uw anus;
- Het inbrengen van het buisje kan onaangenaam zijn. Probeer te ontspannen, dan heeft u er het minste last van.

Hoe lang duurt het onderzoek?

Het onderzoek duurt ongeveer vijf minuten. Bij een behandeling van aambeien kan het onderzoek ongeveer 5 minuten langer duren. Na de behandeling met de rubber bandjes kunt u nog wat bloed verliezen. U kunt hiervoor eventueel een inlegger of extra ondergoed meenemen.

Complicaties

Complicaties komen zelden voor. Krijgt u binnen twee weken na het onderzoek last van toenemende buikpijn, veel bloed bij de ontlasting, moeite met plassen of niet kunnen plassen? Neem dan contact op met de polikliniek Algemene Chirurgie via 020 238 88 00.

De uitslag

De arts bespreekt de uitslag direct na het onderzoek met u. Als het nodig is, krijgt u een vervolgspraak.

FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60% -100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40% - 0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

Wat ik nog wil weten:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Versie: december 2018

ACIBADEM
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER