

# PATIËNTENFOLDER

*Urologie | Besnijdenis (Circumcisie)*

ACIBADEM  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER

U heeft in overleg met uw arts besloten een besnijdenis uit te laten voeren. Bij een besnijdenis verwijdert de uroloog operatief een gedeelte of de hele voorhuid van de penis.

De meeste voorkomende reden voor deze operatie is een te nauwe voorhuid waardoor deze niet meer kan worden teruggeschoven. Door vernauwing van de voorhuid (phimosis) kunnen ontstekingen van de eikel of de voorhuid ontstaan. Ook kunt u moeilijkheden hebben bij het plassen, pijn tijdens erectie en geslachts-gemeenschap.

## Vorbereiding thuis

- Neem een strakke onderbroek of zwembroek mee.
- U hoeft niet nuchter te zijn, omdat de operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Soms verzoekt de arts u thuis voor de operatie de haren rondom de penis weg te scheren.

## Vorbereiding

Om te voorkomen dat bacteriën de operatiewond besmetten, desinfecteert de operatieassistent het operatiegebied met jodium-oplossing en legt steriele doeken over het operatiegebied.

## De operatie

- De uroloog geeft u links en rechts aan de basis van de penis een injectie met een verdovend middel. Als de verdoving na enkele minuten werkt, begint de operatie die ongeveer een half uur duurt;
- De uroloog verwijdert de voorhuid gedeeltelijk of geheel, waardoor de eikel na de operatie onbedekt blijft;
- Het kan zijn dat tussen de eikel en de voorhuid verklevingen zitten. De uroloog maakt deze dan los en hecht vervolgens de huid. De hechtingen zitten in een krans rond de eikel en lossen vanzelf op;
- De wond wordt met vet gaas verbonden.

## Na de operatie

- Een tot twee uur na de operatie raakt de verdoving uitgewerkt en komt het gevoel in de penis terug;
- De eerste dagen na de operatie is de eikel vaak gevoelig, rood, gezwollen en geïrriteerd. Dit is niet verontrustend en verdwijnt in de loop van de week. Het beste kunt u de penis omhoog leggen in de richting van uw navel. Twee tot drie dagen na de operatie is het verstandig een strakke onderbroek of zwembroek te dragen;
- Ook kunt u enkele dagen een branderig gevoel hebben bij het plassen. Bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer;
- Op de plaats van de hechtingen ontstaan korstjes die kunnen gaan prikken. U heeft minder last als u na het douchen het wondgebied insmeert met vaseline;
- Het korter zijn van de voorhuid heeft geen invloed op de seksuele beleving.

## Complicaties

De mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond. Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig verband of een bloeduitstorting onder een hechting. Soms treedt een wondgenezingsstoornis op in de vorm van een abces of infectie. Als de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt, de penis steeds dikker wordt of u koorts krijgt boven de 38,5 °C, neem dan tijdens kantooruren contact op met de polikliniek Urologie, via telefoonnummer 020 23 88 800.

## Naar huis

- U mag zelf geen vervoermiddel besturen. U kunt gebruikmaken van het openbaar vervoer of een taxi. De medewerker bij de receptie bij de ingang van het ziekenhuis bestelt graag een taxi voor u. De kosten van deze taxirit komen voor uw eigen rekening;
- U krijgt mee: een afspraak voor een controlebezoek op de polikliniek Urologie en een eventueel recept voor verbandmateriaal.

## Adviezen voor thuis

- Bij pijn kunt u een tablet paracetamol innemen (500 mg);
- U kunt zich tweemaal daags baden met lauwwarm water. (zonder zeep). Douchen kan ook;
- U kunt wellicht één of twee dagen niet werken. Doe het rustig aan;
- U kunt na ongeveer twee weken weer sporten. Als de wond geheel is genezen, kunt u ook weer zwemmen;
- Als de wond geheel is genezen, kunt u weer geslachtsgemeenschap hebben;
- Draag gedurende twee weken normaal ondersteunende onderbroeken (geen boxershorts);
- Wondverzorging: het verband dat na de operatie is aangebracht, verwijdert u de ochtend van de volgende dag, bijvoorbeeld tijdens het douchen. U spoelt de wond af en droogt de penis voorzichtig met een schone handdoek. Na het douchen of na eerder verlies van het verband, kunt u een nieuw verband aanbrengen.

### *Het nieuwe verband bestaat uit*

- Gaasje rondom de wond;
- Stukje zwachtel om het gaasje vast te houden;
- Pleister om de zwachtel vast te zetten.

## FINANCIËLE ASPECTEN

Deze informatie betreft de verzekering en vergoeding van uw behandeling. Heeft u een verwijzing van uw huisarts? Dan dekt uw zorgverzekering 60%-100% van uw behandeling. Wij vergoeden de resterende 40%-0% voor u. U betaalt dus niets extra's.

Ons privacyreglement vindt u op <http://www.acibademimc.com/over-ons> onder Privacy & klachten. Hier vindt u informatie over de mogelijkheid tot het melden van onveilige situaties (waaronder (bijna-)incidenten); klachten en/of claims;

Bij complicaties kunt u de kliniek (buiten) werktijden op het noodnummer bereiken: 06-214 66 796

## Vragen of suggesties?

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op via telefoonnummer: 020 238 8800.

Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, heeft u opmerkingen over deze brochure of over de gang van zaken tijdens het onderzoek die nuttig kunnen zijn, dan vernemen wij het graag. Volgende patiënten kunnen hier baat bij hebben.

Wat ik nog wil weten:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Versie: januari 2019

**ACIBADEM**  
INTERNATIONAL MEDICAL CENTER